

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE CHAMPAGNE (Tél. 47-22-87)
(ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE)

ABONNEMENT ANNUEL
25 F

DLP 24-11-67 716812

BULLETIN N° 86 de NOVEMBRE 1967

le 23 novembre 1967

INFORMATION

GRANDE CULTURE

Grosse altise du colza ou altise à tête dorée

Les colzas envahis par les altises, ayant été généralement protégés à la suite de notre avis du 25 septembre, ne présentent que très peu d'attaques de larves, sans incidence pour l'avenir de ces cultures. Toutefois, de graves attaques sont observées dans les cultures non protégées ou traitées à contre-temps.

Il est opportun d'examiner soigneusement ces cultures en particulier les bordures de pièces et surtout celles qui sont situées dans la direction de colzas d'hiver de la dernière récolte.

Maintenant, la présence de larves se décèle facilement par l'examen des pétioles des feuilles qui présentent des galeries brunâtres sous leur cuticule. Les dernières pénétrations de larves se remarquent seulement par un trou situé à la face supérieure du pétiole, près de la tige.

Il importe de traiter lorsqu'on dénombre en moyenne plus de 50 % de pieds présentant des attaques.

Pulvériser abondamment (minimum 500 litres/ha) et sous forte pression, une bouillie insecticide apportant l'un des produits suivants sous la forme d'émulsion :

- soit 500 g. de lindane, (matière active par hectare)
- soit 500 g. de parathion - d° -

De préférence, ce traitement devra être effectué par température relativement douce; en outre, il est nécessaire qu'il puisse sécher avant une pluie. Il peut être différé de quelques jours sans inconvénient de manière à intervenir dans de telles conditions.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles.

l'Inspecteur de la Circonscription
Phytopathologique CHAMPAGNE.

7219